

Avertissements agricoles

63M - 19 août 1993

GRANDES CULTURES SEMENCES N° 11

(en collaboration avec les SUAD du Gard et de l'Hérault et les Coopératives SUD-CEREALES et de BARJAC et le Centre Français du Riz)

MAÏS

PYRALE-SESAMIE : remontée très sensible des captures

ACARIENS : présence très fréquente, généralisation des attaques sur quelques parcelles

HELMINTHOSPORIOSE : recrudescence possible à la faveur des orages et rosées matinales

⇒ attention aux parcelles de variétés et de semis tardifs, encore à floraison-grains laitueux.

RIZ

PYRALE : remontée très importante des captures

⇒ attention aux parcelles de variétés sensibles et de semis tardifs, venant juste d'épier

MAÏS

PYRALE- SESAMIE

Stades phénologiques : fin floraison à grains laitueux, les parcelles les plus avancées sont aux stade pâteux.

Situation : pour les deux espèces les vols se prolongent bien, avec quelquefois une remontée très importante des captures (Sésamie dans le Biterrois).

Préconisation :

1. Vous avez programmé 2 traitements d'entrée, le second est à faire dans la période du 15-20 août. Inutile d'intervenir plus, vous êtes couverts.
2. Situations traitées une seule fois du 8 au 14 août, de semis tardifs et encore à floraison, renouvelez l'intervention dans la période du 20-25 août.



DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
ZAC D'ALCO B.P.3056
34034 MONTPELLIER CEDEX 01
Tél : 67.10.19.50

PUBLICATION PÉRIODIQUE
IMPRIMERIE DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON
LE DIRECTEUR M. FREYDIER - N° D'inscription 531 AD
ABONNEMENT ANNUEL - RÉGISSEUR DE RECETTES DE LA D.R.A.F.
C.C.P. MONTPELLIER 5238-12 G

ACARIENS

La période actuelle très chaude est très favorisante à l'explosion des populations acariennes. En présence de foyers bien déclarés, avec des acariens au niveau de la feuille de l'épi, intervenez avec un acaricide spécifique (cf. dernier avis).

HELMINTHOSPORIOSE

Chaleur, humidité, vent marin sont très favorisants. Surveillez vos parcelles, une intervention pouvant être bénéfique jusqu'au stade laiteux (cf. dernier avis).

RIZ

PYRALE 2ème GENERATION

Situation : après une baisse sensible des captures, aux environs du 6 août, nous assistons depuis le 10 août à une très forte remontée de leur nombre.

En conséquence un second train d'éclosion très important va avoir lieu dans la période du 17 au 22 août.

Préconisation :

1. Pour les riziculteurs ayant programmé deux traitements d'entrée, le second était à faire dans la période du 10-14 août
Inutile d'intervenir plus, vous êtes couverts.
2. Situations traitées une seule fois du 3 au 8 août, de variétés sensibles (Ariete, Koral...) semées tardivement et venant juste d'épier (10-15 août) renouveler l'intervention dès réception sans attendre au delà du 22 août.